

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121/TTBVTV-BVTV  
V/v phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ  
trên lúa vụ mùa năm 2018.

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ gây ra các đợt mưa vừa, mưa rất to từ ngày 24-25/6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, một số diện tích lúa mới gieo, cấy tại các huyện, thành phố trong tỉnh bị ngập, nước lũ tràn qua đã tạo kiện cho một số dịch hại phát sinh và gây hại: Bệnh thối nhũn, bệnh nghệt rễ, ốc bươu vàng...

Để hạn chế tác hại của dịch hại gây ra, bảo vệ diện tích lúa mùa. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện một số nội dung sau:

1. Phân công cán bộ xã bám sát cơ sở, phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Khuyến nông các huyện thành phố và Ủy ban nhân dân các xã tăng cường kiểm tra diện tích lúa đã gieo, cấy nắm chắc tình hình phát sinh, gây hại của bệnh thối nhũn, bệnh nghệt rễ, ốc bươu vàng và các dịch hại khác trên lúa mùa, hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

2. Biện pháp phòng trừ bệnh thối nhũn: Do vi khuẩn gây ra

Bệnh gây hại trên trà lúa hồi xanh - đẻ nhánh tại những ruộng bị mưa lũ tràn qua, ngập úng.

Biện pháp phòng trừ:

- Ngừng bón phân đạm và thay nước mặt ruộng, sau đó rải vôi bột từ 6-8 kg/ sào;

- Sử dụng một trong các thuốc trừ bệnh: Xanthomix 20WP, Exin 4.5 HP; Anti-Xo 200WP; Kasumin 2L; Physan 20I; Sa sa 25WP, ...(tuyệt đối không kết hợp phun phân bón lá với thuốc trừ bệnh);

- Sau khi xử lý khoảng 3 - 5 ngày, kiểm tra nếu thấy rễ lúa ra trắng và lúa phát triển trở lại thì bắt đầu bón phân và chăm sóc lúa bình thường.

3. Ốc bươu vàng

Mưa lũ làm cho ốc bươu vàng di chuyển từ ao hồ, suối, mương... vào ruộng lúa gieo sạ, mới cấy dễ gây hại;

Biện pháp phòng trừ: Thu gom ốc, trứng đem tiêu hủy. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Pazol 700WP, Dioto 250 EC, Catfish 70WP, Snail 700WP...

4. Bệnh nghệt rễ sinh lý

Do đất bị ngập úng, trũng hàu, thiếu ôxy, đất bị yếm khí, tích tụ nhiều khí độc làm cho rễ lúa bị thâm đen, sinh trưởng kém.

Biện pháp khắc phục:

- Ngừng bón đạm, thay nước mặt ruộng, bón vôi bột 10 - 15 kg, phân lân nung chảy 10 - 15 kg cho 1 sào kết hợp làm cỏ sục bùn để giải phóng khí độc trong đất;

- Sau khi bón vôi, lân cây đã bén rễ, dần phục hồi trở lại thì cần bổ sung các phân bón vi lượng qua lá (Đầu Trâu MK 30-10-5+TE, Komic -201...) giúp cây phục hồi nhanh, sinh trưởng phát triển tốt.

Ngoài ra lưu ý một số dịch hại khác trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng. Trên mạ mùa bệnh đạo ôn lá, sâu keo, sâu đục thân.

Yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT (B/c);
- Lãnh đạo CC;
- Trung Tâm Khuyến nông
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện (P/h);
- Phòng Kinh tế thành phố
- Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố
- Lưu VT, phòng BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Trần Thị Lịch**