

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TUYÊN QUANG
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Số: 182/TTBVTV- BVTV
V/v tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc
đen hại lúa mùa 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tân Hà, Ý La, Thành phố Tuyên Quang; Trung Môn, Hoàng Khai, Kim Phú, huyện Yên Sơn và xã Thượng Âm, huyện Sơn Dương.

Vụ Mùa 2018 Chi cục Trồng trọt và BVTV đã triển khai lấy mẫu lúa, rầy gửi giám định virus gây bệnh Lùn sọc đen.

Theo kết quả giám định mẫu của Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Bắc, Văn bản số 314/BVTVPB-GĐ ngày 24/8/2018, Văn bản số 336/BVTVPB-GĐ ngày 07/9/2018 và Văn bản số 343/BVTVPB-GĐ ngày 13/9/2018 đã có 19 cá thể/05 mẫu rầy lưng trắng và 03 mẫu lúa dương tính với virus gây bệnh lùn sọc đen; tại các phường Ý La, Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, xã Kim Phú, Hoàng Khai, Trung Môn, huyện Yên Sơn; xã Thượng Âm, huyện Sơn Dương.

Hiện nay lúa mùa sớm và chính vụ đã và đang thu hoạch, lúa mùa muộn đang giai đoạn làm đòng đến trổ, Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn các biện pháp phòng trừ và quản lý bệnh lùn sọc đen tại các vùng có nguồn virus gây bệnh như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Thông tư 58/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2010 quy định biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa; Chỉ thị số 9556/CT-BNN-BVTV ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc; Văn bản Số 1317/BVTV-TV ngày 24/5/2018 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường Tân Hà, Ý La, thành phố Tuyên Quang, xã Trung Môn, Hoàng Khai, Kim Phú, huyện Yên Sơn và xã Thượng Âm, huyện Sơn Dương phối hợp với các Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố thực hiện một số biện pháp quản lý bệnh lùn sọc đen tại vùng đã phát hiện có virus lùn sọc đen như sau:

- Khoanh vùng, phun phòng trừ rầy lưng trắng tại các ổ rầy đã phát hiện dương tính với virus lùn sọc đen và các vùng lân cận; Phun thuốc phòng trừ rầy lưng trắng bằng các loại thuốc có tính nội hấp và tiếp xúc, phun kép 2 lần, cách nhau từ 5-7 ngày bằng các loại thuốc Actara 25 WP, Sạch rầy 200 WP, Sairifos 585 EC, Victory 585 EC, Bassa 50 EC, NIBAS 50ND hoặc các thuốc khác có

cùng hoạt chất....phun đảm bảo lượng nước thuốc phun 20-25 lít nước thuốc/sào. Phun toàn bộ ruộng lúa, bờ cỏ và ruộng nước, những nơi rầy có thể trú ngụ...

- Không bố trí trồng ngô đông trên vùng đã phát hiện virus gây bệnh lùn sọc đen để ngắt nguồn gây bệnh cho vụ sau, chuyển trồng các loại cây trồng khác đảm bảo hiệu quả, khung thời vụ.

- Đối với diện tích lúa mùa đã thu hoạch không trồng cây vụ đông và diện tích lúa chết nằm xen kẽ với các vùng có nguồn virus gây bệnh lùn sọc đen: chỉ đạo làm đất sớm (gặt đến đâu làm đất đến đó), vệ sinh đồng ruộng, cày vùi gốc rạ, lúa chết và cỏ dại để tiêu hủy triệt để nguồn bệnh trên đồng ruộng; những nơi có mật độ rầy lưng trắng cao phải phun trừ rầy trước khi cày vùi, tiêu hủy.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp giải quyết (ĐT: 0207.3817.300)/.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Sở NN & PTNT (B/c);
- Lãnh đạo CC;
- TT Khuyến nông (P/h)
- Lưu VT, phòng BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Trần Thị Lịch