

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: 174/TTBVTV-BVTV

V/v tiếp tục phòng trừ sâu  
bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố

Hiện nay, trên trà lúa mùa muộn giai đoạn làm đòng đến trỗ bông, trà lúa mùa chính vụ giai đoạn chín sữa đến chín các đối tượng sâu, bệnh hại chính như: Rầy nâu và rầy lưng trắng (rầy), sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục, bệnh bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá đang phát sinh, gây hại. Dự báo, thời tiết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, hiện tượng nắng mưa xen kẽ, một số ngày có sương mù về đêm là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại trên tiếp tục phát sinh, gây hại từ nay đến cuối vụ, đặc biệt trên trà lúa mùa muộn, vùng trũng, thấp;

Để hạn chế thiệt hại do sâu, bệnh hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra đòng ruộng, dự tính, dự báo chính xác các đối tượng sâu, bệnh hại cuối vụ, đặc biệt trên trà lúa muộn tại các vùng trũng, vùng thấp để có hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại sau:

*2.1. Rầy nâu và rầy lưng trắng*

Hiện nay, rầy lúa 7 bắt đầu nở và có hiện tượng rầy gồi lúa, cục bộ nơi cao 4.000-5.000 con/m<sup>2</sup>, nếu không phòng trừ sẽ gây hiện tượng cháy chòm cục bộ.

Biện pháp phòng trừ: Phun trừ rầy một trong các thuốc sau: Sairifos 585 EC, Victory 585 EC, Bassa 50 EC, Sạch rầy 200 WP,...hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

*2.2. Bệnh lùn sọc đen*

Bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác trên trà lúa mùa tại các vùng trũng, thấp thuộc huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, Sơn Dương. Bệnh xuất hiện gây hại trên lúa giai đoạn trước trỗ gây hiện tượng cây lúa xanh đậm, thấp lùn, xoắn lá, đòng không trỗ thoát hoặc trỗ thoát nhưng tỷ lệ hạt đen lép nhiều, làm giảm năng suất rõ rệt.

Biện pháp phòng trừ: Hướng dẫn phòng trừ theo Văn bản số 163/TTBVTV- BVTV ngày 10/9/2018 về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 2018.

### 2.3. Sâu đục thân 2 chấm

Hiện nay, sâu đục thân 2 chấm lúa 5 đang gây hại rải rác, trường thành lúa 6 sẽ vũ hóa rộ từ giữa đến cuối tháng 9, sâu non nở gây nên hiện tượng bông bạc cục bộ trên trà lúa muộn giai đoạn lúa trở đến chín sấp.

Biện pháp phòng trừ: Phun phòng trừ trước khi lúa trở bằng một trong các thuốc sau: Voliam targo®063SC, DuPont™ Prevathon® 5SC, Victory 585EC, Bonus-gold 500EC,... hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

2.4. Ngoài ra lưu ý bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông... trên trà lúa muộn.

Lưu ý: Khi sử dụng thuốc hóa học thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng.

Yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị theo quy định./.

Nơi nhân: 

- Như kính gửi (t/h);
  - Sở Nông nghiệp và PTNT( Bc);
  - Lãnh đạo chi cục;
  - Phòng NN và PTNT các huyện,
  - Phòng kinh tế thành phố
  - Trung tâm Khuyến nông
  - Trạm Khuyến nông các huyện, TP
  - Lưu VT; KT.
- (Phối hợp);

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Trần Thị Lịch**