

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: **223/TTBVTV-KT**  
V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên  
cây lúa vụ Mùa năm 2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2022*

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

Qua kiểm tra sản xuất tại các huyện, thành phố, trên trà lúa mùa muộn giai đoạn làm đòng đến trổ bông một số đối tượng sâu bệnh hại đang phát sinh gây hại: Rầy nâu và rầy lưng trắng (rầy) lúa 6 đàng gây hại mật độ phổ biến 500-700 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 1.000-2.000 con/m<sup>2</sup>; sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 đàng gây hại mật độ phổ biến 4-5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 8-10 con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân 2 chấm gây hại giai đoạn lúa trổ bông-chín sữa, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số bông bạc, bệnh bạc lá, đen lép hạt tiếp tục phát sinh gây hại tăng sau các đợt mưa kèm theo dông.

1. Để hạn chế sâu bệnh gây hại trên trà lúa mùa muộn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nhân dân theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh hại trên ruộng và tổ chức phòng trừ hiệu quả, cụ thể:

- Tăng cường cán bộ kiểm tra trên trà lúa làm đòng - trổ bông - chín sữa, theo dõi sát diễn biến phát sinh của sâu bệnh trên lúa; đôn đốc hướng dẫn nhân dân tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn những nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

- Đôn đốc nhân dân tranh thủ những ngày có thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và khẩn trương làm đất, gieo trồng cây vụ đông trong thời vụ tốt nhất.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ, như sau:

a) Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 tiếp tục phòng trừ đến ngày 18/9/2022.

b) Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 7 thời điểm phòng trừ từ ngày 25/9 đến 02/10/2022 giai đoạn chín sữa-sấp trên trà lúa mùa muộn (*ở những diện tích bị ngập úng, ven sông, ven suối*).

c) Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục hướng dẫn nhân dân phòng trừ ở những ruộng bị nhiễm bệnh đặc biệt những ruộng gieo cấy giống lúa lai bản lá to, chịu thâm canh giai đoạn lúa đòng già-trổ bông-phơi màu.

\* Biện pháp phòng trừ: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá thực hiện theo hướng Văn bản số 211/TTBVTV-KT ngày 31/8/2022 của Chi

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về khôi phục sản xuất và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Mùa năm 2022.

d) Sâu đục thân 2 chấm:

Biện pháp phòng trừ: Khi mật độ trứng sâu khoảng 0,5 ổ/m<sup>2</sup> ở giai đoạn làm đòng và theo dõi trưởng thành sâu đục thân 2 chấm xuất hiện trước khi lúa trổ từ 5 - 7 ngày, thì sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phun phòng trừ: Virtako® 40WG, Minecto® Star 60WG; TT Checker 270SC; Enasin 32WP..., nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.

đ) Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên các giống nhiễm như: BC15, Nếp, HT1, Thiên Ưu 8... đặc biệt tại các vùng núi cao như huyện Na Hang.

- Biện pháp phòng trừ: Phun phòng trừ bệnh sớm bằng các loại thuốc đặc trị như: Ninja 35SE, Filia 525 SE, Nativo 750WG... liều lượng thuốc sử dụng theo khuyến cáo in trên nhãn mác. Những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá cần phun phòng đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trổ, phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày.

e) Bệnh đen lép hạt gây hại làm cho hạt lúa bị lửng hoặc lép hoàn toàn, vỏ trấu lốm đốm màu nâu. Bệnh thường gây hại ở giai đoạn lúa trổ bông đến chín sữa khi nhiệt độ thấp ẩm độ không khí cao, lượng mưa lớn và số ngày mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ: Bệnh đen lép hạt lúa làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng của hạt lúa. Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh như: Tilt Super® 300EC; Latimo super 500WP; Supergold 266ME, Furama 480SC..., nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì thuốc.

**Chú ý:** Đối với lúa giai đoạn chín sấp việc sử dụng thuốc BVTV hóa học phải đảm bảo đủ thời gian cách ly thuốc trước khi thu hoạch, tốt nhất nên chọn các loại thuốc có thời gian cách ly ngắn từ 3-7 ngày để tránh tồn dư trong sản phẩm.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (*Phòng Kỹ thuật, điện thoại: 02073.822.752*) để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT; | (B/c)
- UBND các huyện, thành phố; |
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; | (P/h)
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Lưu VT, Phòng KT (DH).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Mạnh Tú**